

様用

症状：意識障害・運動麻痺など

年 月 日

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|---|--|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・意識障害・新たな麻痺をきたさない ・頭部CTで慢性硬膜下血腫の再貯留・再増大を認めない ・合併症を予防し、残った筋力の低下、関節の拘縮を防止する | 退院目標 | 症状が安定し、頭部CT上血腫の増大がない | | |
| | | 転院目標 | 慢性硬膜下血腫による障害が強くリハビリテーションを継続して行う必要があるときには、連携医療機転院してリハビリテーションを継続します | | |
| 経過 | 入院日・手術当日（手術後） | 手術後1日目 | 2日目～6日目 | 7日目～退院 | |
| 日時 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | |
| 食事 | 手術前は飲んだり食べたり出来ません 手術後は医師の許可があれば水分や食事を摂ることができます | | | | |
| 安静度 | 状態に応じてベッド上安静または車椅子移動歩行介助を行います 頭の管がありますので、ベッドの高さを調節しないようお願いします。 分からない事がありましたら看護師にお尋ね下さい | 頭の管が抜けたら、身体の状態によりトイレ歩行ができます | | | |
| 排泄 | 安静度に合わせて尿器またはトイレで行います | トイレ歩行が可能です | | | |
| 清潔 | 入浴できません | 身体を拭いて着替えを行います 髪の毛を洗う事はできません | | 傷口に異常が無くガーゼが取れたらシャワーができます | |
| 処置 | 手術を行います（頭に管が入っています） | CTの結果により、診察時医師が頭の管を抜きます | 入院中は連日医師の診察があります | 医師により頭部の抜糸があります (外来で抜糸される場合もあります) | |
| 注射 | 点滴があります | 抗生素の点滴があります | 食事摂取が十分出来ないときには点滴を行います | | |
| 薬 | 現在内服しているお薬を確認します | 医師の指示で内服を再開します | | | |
| 検査 | 血液検査 胸部Xp 心電図 | CT・MRI | 術後にCT・血液検査を行います | MRI 必要に応じて血液検査・画像検査(CT・MRI)を行います | |
| 説明 | 医師から説明があります 看護師から入院時説明があります 元々服用しているお薬がありましたら、薬手帳とともに看護師にお渡しください | | MSWが御相談に伺います ・医療費の支払いに不安がある人は御相談下さい ・退院後に自宅での受け入れが難しい人は御相談下さい | ●医師と退院後の治療に関して相談します (リハビリテーションの継続が必要な場合には専門の病院に転院します。その場合、転院先を相談します) ●看護師より退院オリエンテーションを行います ①退院後の生活の留意点の説明 ②外来受診日説明 ③継続した服薬が必要な方は処方内容の確認 | |
| 指導 | 特別な栄養管理の必要性 <input checked="" type="radio"/> • 無 | | 薬剤師からのお薬の説明(服薬指導)があります | | |

*状態に応じて予定が変更となる場合があります。

主治医

主治医以外の担当者

看護師

薬剤師

栄養士