



氏名		様		病名；右眼・左眼・両眼			
				症状；			
入院病日・経過	手術前日		手術 当日（ / / ）		術後1日目（ / / ）	術後2日目（ / / ）～	退院（ / / ）
	/		前 後				
目標	・不安なく手術にのぞめる		術後 ・痛みや苦痛があるときは知らせることができる ・歩行時ふらつきがあるときは知らせることができる		・痛み苦痛があるときは知らせることができる ・指示の体位を保持することができる		・術後の点眼が理解できる ・退院後の注意点が理解できる
食事	☐ 月 日 時から食べることが出来ません。 月 日 時から飲むことが出来ません。 ☐ 月 日 朝食後から食べたり飲んだり出来ません。 ☐ 月 日 昼食後から食べたり飲んだり出来ません。		・吐気がない時は飲水、食事が開始になります。 		自由		
活動・排泄	自由		自由 なるべくお部屋に いらして下さい		手術後に体位・安静について医師より指示があります。 体位・安静制限の指示がある場合は、食事・トイレ・診察以外は指示の体位を保持してください。 歩行時ふらつきがある時は知らせて下さい		体位・安静制限の指示がある場合は、食事・トイレ・診察以外は指示の体位を保持してください。
清潔	自由		自由		・顔はタオルで拭くだけにして下さい。 ・顔はタオルで拭くだけにして下さい 		・顔はタオルで拭くだけにして下さい。 ・術後2日後より、首から下のシャワーが可能となります。洗髪は看護師で介助します。 ・術後3日後より、眼のガーゼが診察で外れた方は保精の制限がなくなります。 
内服・点滴	内服薬の確認をします		（ ）時に点滴をします  手術後、問題なければ点滴を抜きます		朝7:30～8:00に診察前の散瞳のため点眼を行います。		
処置	外来より処方されている点眼を前日まで続けます		手術に必要な点眼をします 1時間半前（ : ） 1時間前（ : ） 30分前（ : ） 入室前（ : ） 手術室入室まで30分毎に追加します		・手術後から眼にガーゼと保護板が あたってきます 		・診察時に軟膏を塗布し新しいガーゼに交換します ・診察でガーゼが外れたら、点眼が始まります。 ☐ リノロサル点眼1日4回 ☐ モキシフロキサシン点眼1日4回 ☐ ジクロフェナク点眼1日4回 
説明・指導	特別な栄養管理の必要性 有 ・ 無		・手術室に行く時は、時計、入れ歯、指輪、眼鏡、ヘアピンなど身に付けているものを全てはずします。 ・私物の寝衣の方は、病衣に着替えます。 （ ）時頃車椅子に乗り、手術室へ行きます。		薬剤師から点眼薬の説明をします。		
診察	病棟の診察室で適宜診察をおこないます						
備考							