




氏名 _____ 様 _____

病名；右眼・左眼・両眼

症状；

入院病日・経過	手術前日	手術 当日(/)		術後1日目(/)		術後2日目(/)～		退院(/)		
	/	前	後							
目標	・不安なく手術にのぞめる	術後 ・痛みや苦痛があるときは知らせることができる ・歩行時ふらつきがあるときは知らせることができる			・痛み苦痛があるときは知らせることができる ・指示の体位を保持することができる			・術後の点眼が理解できる ・退院後の注意点が理解できる		
食事	☆ 麻酔科診療後に禁飲食の指示が出ます。 ・()時より食べれません。	・()時より飲むことができません。 		・麻酔が覚めたのを確認後、飲水から開始します。 		自由				
活動・排泄	自由	自由 なるべくお部屋に いらして下さい		手術後に体位・安静について医師より指示がありますが、許可があるまではベッド上で安静にしています。 体位・安静制限の指示がある場合は、食事・トイレ・診察以外は指示の体位を保持して下さい。 歩行時ふらつきがある時は知らせて下さい		体位・安静制限の指示がある場合は、食事・トイレ・診察以外は指示の体位を保持してください。				
清潔	自由	・起床後、洗面・歯みがきをして下さい。		・入浴・洗髪はできません。 ・顔はタオルで拭くだけにして下さい 		・顔はタオルで拭くだけにして下さい。 ・術後2日後より、首から下のシャワーが可能となります。洗髪は看護師で assists します。 ・術後3日後より、目のガーゼが診察で外れた方は保清の制限がなくなります。 		退院前に退院後の生活について別紙で説明します。 		
内服・点滴	内服薬の確認をします	・()時に常用薬を飲みます。		手術室で点滴をします。点滴は手術後、医師の指示により抜きます。		朝7:30～8:00に診察前の散瞳のため点眼を行います。				
処置	外来より処方されている点眼を前日まで続けます	手術に必要な点眼をします 1時間半前(:) 1時間前(:) 30分前(:) 入室前(:) 手術室入室まで30分毎に追加します		・手術後から眼にガーゼと保護板があたってきます。  ・酸素吸入をすることがあります。		・診察時に軟膏を塗布し新しいガーゼに交換します ・診察でガーゼが外れたら、点眼が始まります。 ☐ リノロサル点眼1日4回 ☐ モキシフロキサシン点眼1日4回 ☐ ジクロフェナク点眼1日4回  ・入院中は6時・11時・16時・20時に点眼を行います。 ・退院後は生活に合わせて時間を調整して頂いても大丈夫です。			診察終了後に退院となります。 点眼は退院後も続けてください。	
説明・指導	特別な栄養管理の必要性 有 ・ 無	・手術室に行く時は、時計、入れ歯、指輪、眼鏡、ヘアピンなど身に付けているものを全てはずします。 ・手術室へは()時頃に、病院の寝衣を着て行きます。		薬剤師から点眼薬の説明をします。						
診察	病棟の診察室で適宜診察をおこないます									
備考										

注) 患者様の状態により、予定が変更になることがあります。

主治医 _____ 印 _____

主治医署名 _____
※主治医の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者

看護師 _____
薬剤師 _____
栄養士 _____