

がん化学療法レジメン

2020/12/1

旭川赤十字病院

診療科: 外科・消化器内科

癌種: 大腸がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
Bmab+mFOLFOX6	ベバシズマブ	5 mg/kg	初回90分 点滴静注 2回目60分 以降30分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
Afri+mFOLFOX6	アフリベルセプトベータ	4 mg/kg	点滴静注 60分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	

Pmab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 60分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
FOLFIRI	イリノテカン	150-180 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	14日
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
Bmab+FOLFIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	初回90分 点滴静注 2回目60分 以降30分	d1	14日
	イリノテカン	150-180 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
Afri+FOLFIRI	アフリベルセプトベータ	4 mg/kg	点滴静注 60分	d1	14日
	イリノテカン	150-180 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
Pmab+FOLFIRI	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 60分	d1	14日
	イリノテカン	150-180 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	

	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
RAM+FOLFIRI	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 60分	d1	14日
	イリノテカン	150-180 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注 10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
XELOX	カペシタビン	2000 mg/m ² /Day	経口 1日2回	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
Bmab+XELOX	カペシタビン	2000 mg/m ² /Day	経口 1日2回	d1-14	21日
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 初回90分 2回目60分 以降30分	d1	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
SOX	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 mg/m ² /Day	経口 1日2回	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
Bmab+SOX	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 mg/m ² /Day	経口 1日2回	d1-14	21日
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 初回90分 2回目60分 以降30分	d1	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
IRIS	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 mg/m ² /Day	経口 1日2回	d1-14	28日
	イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注 90分	d1, 15	
Bmab+IRIS	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 mg/m ² /Day	経口 1日2回	d1-14	28日
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 初回90分 2回目60分	d1, 15	

			以降30分		
	イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注 90分	d1, 15	
FOLFOXIRI	イリノテカン	165 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	3200 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	
Bmab+FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5 mg/kg	初回90分 点滴静注 2回目60分 以降30分	d1	14日
	イリノテカン	165 mg/m ²	点滴静注 60分	d1	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	3200 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	