

がん化学療法レジメン

2020/12/1

診療科: 外科・消化器内科

旭川赤十字病院

癌種: 膵臓がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	28日
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	28日
	パクリタキセル (アルブミン懸濁)	125 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	
GS	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80mg/m ²	経口 1日2回	d1-14	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8	
GC	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8	21日
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注 60分	d1,8	
mFOLFIRINOX	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注 90分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注 2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注 46時間	d1	

癌種: 肝臓がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日
Bmab+アテゾリズマブ	ベバシズマブ	15 mg/kg	初回90分 点滴静注 2回目60分 以降30分	d1	21日
	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注 1時間	d1	