

# がん化学療法レジメン

2022/12/1

旭川赤十字病院

診療科: 血液腫瘍内科

癌種: 多発性骨髄腫

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
DBd (1-3サイクル目)	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	d1,4,8,11	21日
	デキサメタゾン	20 mg/day	内服/点滴静注	d 1-2、4-5、 8-9、11-12、 15	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1,8,15	
DBd (4-8サイクル目)	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	d1,4,8,11	21日
	デキサメタゾン	20 mg/day	内服/点滴静注	d 1-2、4-5、 8-9、11-12、	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1	
DRd (9サイクル以降)	デキサメタゾン	20 mg/day	内服/点滴静注	d1	21日

DRd (7サイクル以降)	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1	28日
DKd (1-2サイクル目)	カルフィルゾミブ	56 mg/m <sup>2</sup> (初回day1,2のみ20 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注	d1-2,8-9, 15-16	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day (day22は40mg)	内服/点滴静注	d1-2,8-9, 15-16,22	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1,8,15,22	
DKd (3-6サイクル目)	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1-2,8-9, 15-16	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day (day22は40mg)	内服/点滴静注	d1-2,8-9, 15-16,22	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1,15	
DKd (7サイクル以降)	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1-2,8-9, 15-16	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day (day22は40mg)	内服/点滴静注	d1-2,8-9, 15-16,22	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1	
DRd (1-2サイクル目)	レナリドミド	25mg/day	内服	d1-21	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day (週40mg)	内服/点滴静注	d1-2,8-9, 15-16,22-23	
	ダラツムマブ	1800 mg/day	皮下注射	d1,8,15,22	

DRd (3-6サイクル目)	レナリドミド	25mg/day	内服	d1-21	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day×2日又は 40m g /day×1日	内服/点滴静注	d1-2,8 15-16,22	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1,15	
DRd (7サイクル目以降)	レナリドミド	25mg/day	内服	d1-21	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day×2日又は 40m g /day×1日	内服/点滴静注	d1-2,8,15,22	
	ダラツムマブ	1800 mg	皮下注射	d1	
EPd (1-2サイクル目)	ポマリドミド	4mg/day	内服	d1-21	28日
	デキサメタゾン	40 mg	点滴静注	d1,8,15,22	
	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	d1,8,15,22	
EPd (3サイクル目以降)	ポマリドミド	4mg/day	内服	d1-21	28日
	デキサメタゾン	40 mg	点滴静注又は内服	d1,8,15,22	
	エロツズマブ	20 mg/kg	点滴静注	d1	

Kd(週1回投与)	カルフィルゾミブ	70 mg/m <sup>2</sup> (1コースday1のみ 20 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注	d1,8,15	28日
	デキサメタゾン	40 mg/day	内服	d1,8,15,22	
Kd(週2回投与)	カルフィルゾミブ	56 mg/m <sup>2</sup> (1コースday1,2のみ 20 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注	d1-2,8-9, 15-16	28日
	デキサメタゾン	20 mg/day	内服	d1-2,8-9, 15-16,22-23	
VMP	メルファラン	7 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-4	35日
	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-4	
	デキサメタゾン	20 mg/day	内服	d8-9,15-16 22-23	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射	d1,8,15,22	

## 癌種: 悪性リンパ腫

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
RVP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	28日
	プレドニゾロン	30 mg/分2	内服	d1-7	
	エトポシドカプセル	50 mg/分2	内服	d1-7	

## 癌種: 骨髄異形成症候群

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
AZA	アザシチジン	75 mg/m <sup>2</sup>	皮下/静注	d1-7	28日