

がん化学療法レジメン

2024/11/1

旭川赤十字病院

診療科: 外科・消化器内科

癌種: 胃がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間		投与日	投与間隔
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	14日
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間	d1	
S-1+CDDP	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-21	35日
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	120分	d8	
S-1+CDDP+Tmab	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 以降 6 mg/kg	点滴静注	初回90分 以降30分	d1	
XELOX	カペシタビン	2000 mg/m ² /day	経口	1日2回	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
XP	カペシタビン	2000 mg/m ² /day	経口	1日2回	d1-14	21日
	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
	カペシタビン	2000 mg/m ² /day	経口	1日2回	d1-14	

XP+Tmab	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	21日
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 以降 6 mg/kg	点滴静注	初回90分 以降30分	d1	
CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	d1,15	28日
DTX	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	1時間	d1	21日
wPTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	1時間	d1,8,15	28日
nab-PTX	パクリタキセル (アル ^β シ懸濁)	260 mg/m ²	点滴静注	30分	d1	21日
Weekly nab-PTX	パクリタキセル (アル ^β シ懸濁)	100 mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8,15	28日
wPTX+RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	1時間	d1,15	28日
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	1時間	d1,8,15	
RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	1時間	d1	14日
SOX	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
SOX+Tmab	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 以降 6 mg/kg	点滴静注	初回90分 以降30分	d1	
S-1+DTX	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	ドセタキセル	40 mg/m ²	点滴静注	1時間	d1	
ペムブロリズマブ+SOX	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
ペムブロリズマブ+XELOX	カペシタビン	2000 mg/m ² /day	経口	1日2回	d1-14	21日
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	

ゾルベツキシマブ+XELOX	カペシタビン	2000 mg/m ² /day	経口	1日2回	d1-14	21日
	ゾルベツキシマブ(初回)	800mg/m ²	点滴静注	50mL/hrから開始し、30分	d1	
	ゾルベツキシマブ(2回目以降)	600mg/m ²	点滴静注	ごとに100mL/hr、150mL/hr、200mL/hr	d1	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
ゾルベツキシマブ+FOLFOX	ゾルベツキシマブ(初回)	800mg/m ²	点滴静注	50mL/hrから開始し、30分	d1	14日
	ゾルベツキシマブ(2回目以降)	400mg/m ²	点滴静注	ごとに100mL/hr、150mL/hr、200mL/hr		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	2時間		
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注	2時間		
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	10分		
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間		
ニボルマブ+FOLFOX	ニボルマブ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	10分	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	46時間	d1	
ニボルマブ+SOX	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	30分	d1	
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	d1	

診療科: 外科・消化器内科

癌種: 食道がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
dTX	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間	d1	21日