

がん化学療法レジメン

2024/11/1

旭川赤十字病院

診療科: 血液腫瘍内科

癌種: 多発性骨髄腫

| レジメン名 | 一般名 | 推奨投与量 | 投与時間 | 投与日 | 投与間隔 |
|----------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|------|
| DBd (1-3サイクル目) | ボルテゾミブ | 1.3 mg/m ² | 皮下注射 | d1,4,8,11 | 21日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服/点滴静注 | d 1-2、4-5、 8-9、11-12、 15 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1,8,15 | |
| DBd (4-8サイクル目) | ボルテゾミブ | 1.3 mg/m ² | 皮下注射 | d1,4,8,11 | 21日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服/点滴静注 | d 1-2、4-5、 8-9、11-12、 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|---|---------|--------------------------|-----|
| DBd (9サイクル以降) | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服/点滴静注 | d1 | 21日 |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1 | |
| DKd (1-2サイクル目) | カルフィルゾミブ | 56 mg/m ² (初回day1,2のみ20 mg/m ²) | 点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day (day22は40mg) | 内服/点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16,22 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1,8,15,22 | |
| DKd (3-6サイクル目) | カルフィルゾミブ | 56mg/m ² | 点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day (day22は40mg) | 内服/点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16,22 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1,15 | |
| DKd (7サイクル以降) | カルフィルゾミブ | 56mg/m ² | 点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day (day22は40mg) | 内服/点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16,22 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1 | |
| DRd (1-2サイクル目) | レナリドミド | 25mg/day | 内服 | d1-21 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day (週40mg) | 内服/点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16,22-23 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------|-----|
| | ダラツムマブ | 1800 mg/day | 皮下注射 | d1,8,15,22 | |
| DRd (3-6サイクル目) | レナリドミド | 25mg/day | 内服 | d1-21 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day×2日又は 40mg/day×1日 | 内服/点滴静注 | d1-2,8 15-16,22 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1,15 | |
| DRd (7サイクル目以降) | レナリドミド | 25mg/day | 内服 | d1-21 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day×2日又は 40mg/day×1日 | 内服/点滴静注 | d1-2,8,15,22 | |
| | ダラツムマブ | 1800 mg | 皮下注射 | d1 | |
| EPd (1-2サイクル目) | ポマリドミド | 4mg/day | 内服 | d1-21 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 40 mg | 点滴静注 | d1,8,15,22 | |
| | エロツズマブ | 10 mg/kg | 点滴静注 | d1,8,15,22 | |
| EPd (3サイクル目以降) | ポマリドミド | 4mg/day | 内服 | d1-21 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 40 mg | 点滴静注又は内服 | d1,8,15,22 | |
| | エロツズマブ | 20 mg/kg | 点滴静注 | d1 | |

| | | | | | |
|--------------|----------|---|---------|--------------------------|-----|
| Kd(週1回投与) | カルフィルゾミブ | 70 mg/m ² (1コースday1のみ 20 mg/m ²) | 点滴静注 | d1,8,15 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 40 mg/day | 内服 | d1,8,15,22 | |
| Kd(週2回投与) | カルフィルゾミブ | 56 mg/m ² (1コースday1,2のみ 20 mg/m ²) | 点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16 | 28日 |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服 | d1-2,8-9, 15-16,22-23 | |
| VMP | メルファラン | 7 mg/m ² | 内服 | d1-4 | 35日 |
| | プレドニゾロン | 60 mg/m ² | 内服 | d1-4 | |
| | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服 | d8-9,15-16 22-23 | |
| | ボルテゾミブ | 1.3 mg/m ² | 皮下注射 | d1,8,15,22 | |
| IsaKd(1コース目) | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服/点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16,22-23 | 28日 |
| | サークリサ | 10mg/kg | 点滴静注 | d1,15 | |
| | カルフィルゾミブ | 56 mg/m ² | 点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------------------|---------|--------------------------|-----|
| IsaKd(2コース目以降) | デキサメタゾン | 20 mg/day | 内服/点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16,22-23 | 28日 |
| | サークリサ | 10mg/kg | 点滴静注 | d1,8,15,22 | |
| | カルフィルゾミブ | 56 mg/m ² | 点滴静注 | d1-2,8-9, 15-16 | |

癌種: 悪性リンパ腫

| レジメン名 | 一般名 | 推奨投与量 | 投与時間 | 投与日 | 投与間隔 |
|--------------------|-----------|-----------------------|------|------|------|
| RVP | リツキシマブ | 375 mg/m ² | 点滴静注 | d1 | 28日 |
| | プレドニゾロン | 30 mg/分2 | 内服 | d1-7 | |
| | エトポシドカプセル | 50 mg/分2 | 内服 | d1-7 | |
| Pola-R-CHP(1サイクル目) | プレドニゾロン | 60 mg/m ² | 内服 | d1-5 | 21日 |
| | リツキシマブ | 375 mg/m ² | 点滴静注 | d2 | |
| | ポライビー | 1.8 mg/kg | 点滴静注 | d1 | |

| | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|------|-------|-----|
| | ドキソルビシン | 50 mg/m ² | 静注 | d1 | |
| | エンドキサン | 750 mg/m ² | 静注 | d1 | |
| Pola-R-CHP(2-6サイクル目) | プレドニゾロン | 60 mg/m ² | 内服 | d1-5 | 21日 |
| | リツキシマブ | 375 mg/m ² | 点滴静注 | d1 | |
| | ポライビー | 1.8 mg/kg | 点滴静注 | d1 | |
| | ドキソルビシン | 50 mg/m ² | 静注 | d1 | |
| | エンドキサン | 750 mg/m ² | 静注 | d1 | |
| A+AVD | アドセトリス | 1.2 mg/kg | 点滴静注 | d1,15 | 28日 |
| | ドキソルビシン | 25 mg/m ² | 静注 | d1,15 | |
| | エクザール | 6 mg/m ² | 静注 | d1,15 | |
| | ダカルバジン | 375 mg/m ² | 点滴静注 | d1,15 | |

癌種: 骨髄異形成症候群

| レジメン名 | 一般名 | 推奨投与量 | 投与時間 | 投与日 | 投与間隔 |
|-------|--------|----------------------|-------|------|------|
| AZA | アザシチジン | 75 mg/m ² | 皮下/静注 | d1-7 | 28日 |