

# がん化学療法レジメン

2024/11/1

診療科: 外科・消化器内科

旭川赤十字病院

癌種: 膵臓がん.胆管がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間		投与日	投与間隔
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8,15	28日
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8,15	28日
	パクリタキセル (アルブミン懸濁)	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8,15	
GS	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	80 -120mg/day	経口	1日2回	d1-14	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	
mFOLFIRINOX	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d1	14日
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	d1	
	レボホリナートCa	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	d1	
GC	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	21日
	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1,8	
nal-IRI+5-FU/LV	オニバイド	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d1	14日
	レボホリナートCa	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	d1	
デュルバルマブ+GC	イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	1時間	d1	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	
	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	d1,8	

(固定用量)デュルバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	1時間	d1	28日
ペムブロリズマブ+GC	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	21日
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	
	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	d1,8	
維持療法 ペムブロリズマブ+GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	21日
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	

**癌種: 肝臓がん**

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間		投与日	投与間隔
RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	1時間	d1	14日
Bmab+アテゾリズマブ	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 以降30分	d1	21日
	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	1時間	d1	
デュルバルマブ+トレメリムマブ	イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	1時間	d1	28日
	イジユド	300mg/body	点滴静注	1時間	d1	
デュルバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	1時間	d1	28日