


## 褥瘡



## 1. 褥瘡推定発生率：0.65%

褥瘡対策未実施減算が廃止され褥瘡予防が実施されることが標準となった今日、体圧分散寝具の使用が必須であり、その他に体位変換、除圧、ずれの解除、スキンケアなど看護が重要となります。当院でも褥瘡チームを中心に褥瘡予防ケアに取り組んでいます。褥瘡推定発生率は、褥瘡のリスクアセスメントを行い、必要な褥瘡予防計画を立案し行ったケアの評価の一つとなります。



分子：新たに褥瘡が生じた患者数（DESIGN-R®分類別d1～Uの人数）の総計

分母：病院の入院実患者数


×100 (%)

※DiNQL比較対象施設の条件：406病院（2024年度データより）

項目	比較対象施設の条件
設置主体	全て
病院機能	全て
稼働病床数	全て
病床区分	全病床区分

## 2. 新規発生した褥瘡の改善率：70.0%

褥瘡の改善率は、褥瘡の深さや患者の個々の要因が大きく関与します。褥瘡が発生した要因をアセスメントし、ケアすることで褥瘡がどれだけ治癒できたかは、ケアの評価の指標の1つになります。




分子：新たに病院で褥瘡が生じた患者（分母）のうち褥瘡が改善した患者数（実人数）

分母：新たに病院で褥瘡を生じた患者数(DSIGN-R®分類別人数を合計) ×100 (%)

## 3. 入院時既に有していた褥瘡の改善率：77.4%

2. に同じ



分子：入院時に既に褥瘡を有していた患者（分母）のうち褥瘡が改善した患者数（実人数）

分母：入院時に既に褥瘡を有していた患者 ×100 (%)