症状: 患者ID 様 病名: 年 月 入院•手術前日 手術 術後 術後1日日 術後2日目 術後3~4日目 術後5~8日日 経過 術前 退院療養計画書 月日 ≪退院基準≫・創部の異常がない 【手術前】 【手術後】 退院日(予定) ・手術に起こる合併症(出血・腸閉塞等)が無い 目標 手術について理解し、準備が整っている 発熱がない ・安心して手術に臨むことができる 痛みが最小限で過ごすことができる ・栄養指導について理解できる 月 食事は食べられます 21時より禁食 時以降飲水禁止 飲食禁止口 許可がでたら飲水出来ます 栄養指導を行います 食事 (家族の方は同席して下さい) 許可がでたら食事を開始します 退院後の治療計画 ※入院中に行えない場合は退院後外来で行います 手術後は蛋白制限食です 手術室には歩いて 帰室直後はベッド上で安静が必要です 歩行許可が出たら、頑張って歩きましょう □旭川赤十字病院泌尿器科 行きます 外来にて通院治療を行います 許可がでたらベッド上で座ります 安静度 制限はありません 歩けない方は 状況に応じて病室内の歩行から始めます ストレッチャーで 口その他 初回は看護師が付き添い歩行します 行きます 許可が出たら尿の管を抜きます 手術前に座薬を 手術後は尿の管が入ります 退院後の療養上の留意点 排泄 使用します (抜く際に検査が必要となることがあります) 📶 身体を拭き 背中の痛み止めの管が抜けるとシャワー浴ができます 清潔 シャワー浴ができます 着替えます 生活の制限はありません 内服中の薬を確認します 手術後、点滴をします 7時に麻酔科医の指示 ★持参された内服薬は医師の指示で再開します 手術後、背中に痛み止めの の持参薬を内服します 下記の場合、泌尿器科外来 細い管が入ることがあります (休日・夜間は救急外来)に御連絡下さい 午後の手術の場合、 必要に応じて受診していただきます ★痛い時は痛み止めを使いま 点滴 手術前に点滴をします。 薬剤師より薬の説明があります 服薬指導 ▶ 38℃以上の発熱がある ★背中の痛み止めの細い管を抜きます ▶ 強い痛みが続く 手術後、採血があります ▶ 濃い血尿が続く ▶ 尿が出ず、腹が張る 手術後酸素吸入を行います 採血が 回診後、退院です 検査 あります 心電図モニター装着します 血栓予防のための器械が The second 足についてきます 処置 (歩行できるようになったら 退院後必要となる 除去します) 保健医療サービス又は福祉サービス ≪手術に行く前に≫ ★痛みや尿の管の違和感、吐き気など我慢せずに看護師知らせましょう ・看護師より入院・手術について **FR** 説明があります ・貴重品は金庫またはご家族で保管してください ・メガネ、入れ歯、指輪、カツラ等は必ず外します 退院後の生活について看護師より説明があります 麻酔医による説明があります (家族の方は同席して下さい) (補聴器はつけたままで構いません) 特にありません 説明 必要に応じて栄養相談があります 手術当日はひげを剃って下さい。お化粧はできません マニキュア・ペディキュアは除去して下さい ※次回の外来受診時に病理組織の説明があります 今後の治療の説明をします 手術について理解しましょう その他 不安なく手術が受けられるように ご家族は手術後に医師から説明があります 休みましょう (電話で説明する場合もあります) ・心配事や眠れない時は看護師に 知らせましょう 手術後は術後管理のため、ICUに入室する場合があります 特別な栄養管理の必要性(有)・無 ≪手術に必要なもの≫ ※40歳以上の方は、別紙《総合機能評価表》を用いて総合的な機能評価を行う場合があります ・テープ止めタイプオムツ1枚 ★わからないこと、心配なことは遠慮なく医師・看護師にご相談ください ★状態に応じて、予定が変更になることがあります

王治医	荆	
主治医署名		

※主治医の押印がある場合は不要