様

- ◇ この検査は手の付け根から動脈にカテーテルという管を挿入し、造影剤を用いて脳血管を調べる検査です。
- ◇ この検査は侵襲性を伴う検査であり、合併症の危険性もゼロではありません。検査の目的、必要性をご理解頂た上で行っております。 (承諾書の内容をよくお読みになり、サインをしていただきます。)
- ◇ 検査時間は約1時間で、検査前・後に色々な処置、制限があります(下記表を参照してください)
- ◇ 太い血管に管を挿入するため、管を抜いた後の出血を防ぐため、検査後の安静は必ず守ってください。 検査終了後に10分間圧迫止血をします。その後は圧迫帯をつけて6時間圧迫を続けます。

経過		検査翌日	(2日目)				
	検査日 (検査前)	帰室時	30分一1時間後	3時間-5時間後	6 時間後以降		
日時		· 月	l B			月	B
目標	不安、心配を和らげ万全の状態で 検査に臨むことができる。	検査後の苦痛が最小限に抑えられ、安静を守ることができる。				合併症が起きずに退	完できる。
食事	昼食は半分程度食べてください		造影剤の排泄を促すため、水分を多めにとっていただきます。			制限はありません。	
活動			は、ベット上安静をして すでの移動となります。 さい。		歩行可能となります。 看護師が止血の確認に行き ますのでお待ち下さい。	制限はありません。	1
清潔			<u>入浴で</u>	きません。	×	入浴できます。	***
点滴	左手から点滴をとります。	点滴が終了したら抜去します。					
検査	例目で 時頃より開始予定です。		-				
処置	血管の触れをみるために手に印をつけます。 痛み止めのテープを2か所腕に貼ります。 上半身は病衣だけになって頂き、 車イスで検査室に行きます。	時間ごとに手の脈の触れを確認します。 <u>手がしびれたり、痛いときは申し出て下さい。</u>			圧迫帯は朝看護師が外しに行きます。 自分では外さないで下さい。 痛みがある場合はお知らせください。		
備考	<u>薬のアレルギー等があるときは申し出て下さい。</u> 特別な栄養管理の必要性 有 ・①無 40歳以上の方は、別紙《総合機能評価表》を用いて総合的な機能評価を行う場合があります。						

*	状態に	応	じて予	定がす	で面と	・かる	提合?	があり	ます

主治医 印

主治医署名

※主治医の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者 看護師:

薬剤師: 栄養士:

脳血管撮影検査(橈骨正中用)を受けられる患者様へ(退院療養計画書)

脳-35-03B-2

	<u>年月日</u>
病 棟	6階きた 入院 フロア
主 治 医	
退院後の治療計画	□ 当院当科外来で通院治療を行います。 □ 他院 () で通院治療を続けます。 □ その他
退院後の療養上の留意点	□ 特にありません□ その他
その他	

旭川赤十字病院 6階きた入院フロア