患者ID

病名 症状 年 月 н 入院病日 入院当日 手術後6日目~ 退院療養計画書 手術当日(前) 手術当日(後) 手術後1日目 手術後2日目 手術後3~5日目 (手術前日) 術後7日目転科·退院 経過 月 日) 退院日(予定) 1)37.5度以上の発熱がない ①血圧・脈拍・呼吸・体温が安定している ①傷が赤くない、腫れない 月 日 ②不安がなく、手術の準備ができる 成果月標 ②傷から出血がない ②食事を半分以上食べることができる ③痛み、吐き気、頭痛がない、または薬で自制できる ③酸素なしで歩いても苦しくない 退院後の治療計画 常食/特別食 絶飲食の指示は麻酔科の 絶飲食です 医師の指示で 常食 飲水、食事が開始 特別食(食事制 指示になります。 食事 になります。 限がある方) 旭川赤十字病院呼吸器 外科外来にて通院治療を 歩く練習をします 病棟内・院内を自由に歩けます。 (胸の管が入っている間は、病棟内のみで 行います 自由にお過ごし下さい ICUE - 般病棟に 入室して 移動して 活動 いく事ができます す゛ ベッド上 座る練習を その他 安静です **ょす** 入浴又はシャワー浴が 髪の毛の長い人は2つに分 タオルで体を 管が入っていてもおおえばシャワーに入ることができます できます け、三つ編みをして下さい ふきます 清潔 洗髪・入浴・爪切りを行って 男性はひげを剃りを済ませ 下さい(手術前日) て下さい 退院後の療養上の留意点 必要時、背中から痛み止めの点滴を24時間 痛み止めの管を術後3日目までに 持続注入します 薬を内服している方は、 点滴・注射 点滴は術後1日目まで行います 処方通り内服して下さい 服用中のお薬を看護師に 必要時内服で 退院前に薬剤師からの服薬 ·その他 痛み止めが開始に 渡して下さい 指導があります 内服薬 医師の指示により中止 なります こなる薬があります 必要に応して CT検査があります CT 術後1~4日目まで毎日、レントゲン検査があります。必要に応じて胸部の 必要時 レントゲン 心電図 採血 採尿をとります レントゲン 採血 術後1日目と4日目に採血検査があります。 検査 後接查 保健医療サービス又は X-ray X-ray 福祉サービス 手術室まで徒歩、または 酸素マスクがつきます リストバンドをつけます 状態に応じて酸素マスクをはずします 寝台で移動します。 心電図モニターがつきます 傷にあたっているガーゼをはずします 口特にありません 処置 毎日 午前中 回診が 吸入をします(1日3回)/4日間 胸の管・尿管が入ります 状態に応じて胸の管と尿管を抜きます。胸の管は7日目に、抜糸をします □その他 あります 禁煙をしましょう 入れ歯・アクセサリーなど 身につけている物は全て 術後4日目に 指導 外して下さい ベッドサイドで 栄養指導が ベッドサイドで 貴重品は家族の方に保管してもらって下さい ☆40歳以上の方は、別紙《総合機能評価表》を用いて総合的な機能評価を行う場合があります。 あります 栄養指導があります 看護師から手術の説明が 麻酔科医師の診察がありま 手術後医師より家族の方 その他 あります 家族の方はラウンジか に説明があります 病室でお待ち下さい 夜間家族の付き添いは 必要物品 *全てローソンにありま 主治医より家族も含めて 原則としてお断り致しま 説明 す。T字帯(1枚)オムツ |手術の説明があります (1枚) 、腹帯(2・3枚) 承諾書(輸血同意書)に署 **■ ■** を前日までに用意して下名後、看護師に渡して下さ 観察 血圧・脈拍・体温測定をします 頻回に観察します 血圧、脈拍、体温測定をします

主治医	印	
	主治医以外の担当者	看護師:
主治医署名		薬剤師:

※主治医の押印がある場合は不要

薬剤師 栄養士 旭川赤十字病院 6階みなみ 入院フロア